

НАЗНАЧЕНИЕ:

Снятие зуда, связанного с аллергическим и/или атопическим дерматитом у собак в возрасте от 12 месяцев и старше

ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ:

- Апоквел применяется в дозировке 0,4-0,6 мг/кг
- Апоквел применяют 2 раза в день первые 14 дней и далее, в целях поддерживающей терапии, по 1 таблетке в день
- Апоквел можно давать с кормом или самостоятельно

Масса собаки, кг	Апоквел 3,6 мг	Апоквел 5,4 мг	Апоквел 16 мг
3 - 4,4	1/2		
4,5 - 5,9		1/2	
6 - 8,9	1		
9-13,4		1	
13,5-19,9			1/2
20-26,9		2	
27-39,9			1
40-54,9			1+1/2
55-80			2

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Не используйте АПОКВЕЛ у собак младше 12 месяцев, массой менее 3х кг или у животных с признаками серьезных инфекций.

АПОКВЕЛ может способствовать ухудшению состояния животного в случаях наличия серьезных инфекционных заболеваний, кожных паразитарных инфекций (таких как демодекоз), онкологических заболеваний или предрасположенности к ним.

АПОКВЕЛ не исследовался на животных, получавших в качестве лечения кортикостероиды и циклоспорины.

Не используйте АПОЛВЕЛ в период вязки, во время беременности и лактации.

Наиболее часто встречающиеся побочные явления включают в себя диарею и рвоту.

АПОКВЕЛ безопасен при использовании со многими препаратами, включая противопаразитарные препараты, антибиотики и вакцины.