

Без блох и клещей
до 15 недель*



гибель блох до откладки яиц,
через 3 ч после применения



для собак от 8 недель
и весом от 1,3 кг



защищает от 9 видов
иксодовых клещей



1 таблетка действует
35 дней (5 нед.).
1 упаковка - до 15
недель защиты*



лечение и профилактика
отодектоза, саркоптоза,
демодекоза



При применении в соответствии
с инструкцией побочные явления
не наблюдаются



снижает риск трансмиссивных
заболеваний (бабезиоз,
анаплазмоз, боррелиоз)



таблетка с привлекательным
вкусом, биодоступность
не зависит от приема корма



* При использовании 1 упаковки на 3 таблетки. В сезон активности блох и иксодовых клещей препарат следует применять ежемесячно


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

zoetis

СИМПАРИКА – таблетки для перорального применения для лечения и профилактики энтомозов и акарозов собак.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО: сароланер.

НАЗНАЧЕНИЕ: Симпарикау назначают собакам для лечения и профилактики энтомозов, вызываемых блохами (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*), акарозов, вызываемых иксодовыми (*Dermacentor reticulatus*, *Dermacentor variabilis*, *Ixodes hexagonus*, *Ixodes holocyclus*, *Ixodes ricinus*, *Ixodes scapularis*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Amblyomma americanum*, *Amblyomma maculatum*), саркоптоидными (*Sarcoptes scabiei*), псороптоидными (*Otodectes cynotis*) и демодекозными (*Demodex canis*) клещами. Симпарика снижает риск передачи возбудителей бабезиоза (*Babesia canis*), болезни Лайма (*Borrelia burgdorferi*) и анаплазмоза (*Anaplasma phagocytophilum*), вследствие уничтожения иксодовых клещей до передачи возбудителей вышеуказанных болезней.



ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Симпарикау применяют собакам в любое время года индивидуально перорально с руки, или в смеси с кормом в минимальной дозе сароланера 2 мг/кг. В сезон активности блох и иксодовых клещей препарат следует применять ежемесячно. При лечении саркоптоза, демодекоза и отодектоза применяют двукратно с интервалом 30 дней.

* При использовании 1 упаковки на 3 таблетки. В сезон активности блох и иксодовых клещей препарат следует применять ежемесячно

a - 6 видов упаковок для собак весом в диапазоне от 1,3 кг до 60 кг.

b - При применении препарата в соответствии с инструкцией

c - Нарушает жизненный цикл блох, гибель блох до откладки жизнеспособных яиц.